



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΚΤΟΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ:
OTHELLO 3GB

Κοχλιολειμακοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Μετά από λήψη του δολώματος και την αρχική υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες χάνουν την κινητικότητα τους, παραλύουν και πεθαίνουν.

Είναι κοκκώδες δόλωμα (GB) με 3% β/β δραστική ουσία Metaldehyde και 96.95% β/β βοηθητικές ουσίες. Περιέχει πικραντικό παράγοντα.

Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Cropchem España S.L.,
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A.

Στόχος:
Για **Κοχλίες** (Σαλιγκάρια) HELXAS, **Γυμνοσάλιαγκες** (Λείμακες, Αρίονες) ARIOSP, DERORE, ARIOHO.

Δόσεις:
700 γρ. σκευάσματος/στρέμμα.

Πεδίο Εφαρμογής-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Για **Ελαιοκράμβη** BRSNN με εφαρμογή στην γραμμή σποράς ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, από την σπορά μέχρι το στάδιο της «ροζέτας». Για **Σιτάρι** TRZAX, **Κριθάρι** HORVX, **Βρώμη** AVESA, **Σίκαλη** SECCE και Triticale TTLRI με εφαρμογή στην γραμμή σποράς ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους από την σπορά μέχρι το τέλος του αδελφώματος. Για **Καλλωπιστικά** με εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους κατά την σπορά ή φύτευση και επανάληψη ανάλογα με την προσβολή. Για **Χλοοτάπητα** με εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια κατά την σπορά ή φύτευση και επανάληψη ανάλογα με την προσβολή.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

3 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Η εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο, όταν επικρατεί υγρασία και ήπιος καιρός και τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.
2. Εφαρμόστε αμέσως με την έναρξη της προσβολής.
3. Όταν η προσβολή είναι βαριά ή παρατεταμένη, απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής.
4. Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή διότι μπορεί να μειωθεί η διάρκεια δράσης των κόκκων.

5. Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.

6. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε λίγες μέρες πριν από καλλιεργητικές εργασίες. Εναλλακτικά, εφαρμόστε λίγο πριν ή λίγο μετά τις καλλιεργητικές εργασίες.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή γίνεται με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων ή λιπασμάτων, στην γραμμή σποράς ή φύτευσης ή ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του εδάφους.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --.

Συνδυαστικότητα: --.

Φυτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μη εφαρμόσιμο.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό (θερμοκρασίες < 35°C) και καλά αεριζόμενο, μακριά από την έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τα άγρια πουλιά/θηλαστικά μαζέψετε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε απόσταση 5 μέτρων από τις όχθες επιφανειακών υδάτων (ρυάκι ή κανάλι). Για να επιτευχθεί αυτό, οι χρήστες θα πρέπει να υπολογίσουν το πλάτος διασποράς του μηχανήματος, πριν την εφαρμογή.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.